

放电指示病人体外冲击波碎石术

这将需要花费数个小时的药物穿了，所以休息时，你回家，直到你感到舒服增加您的活动。

由于药物在您收到您的治疗，不要喝酒，驱动器，或操作任何危险机械24小时。

随着您的胃口的回报，从液体，然后对你的胃口。返回到正常的饮食，除非另有指示您的医生。

您的尿液将血腥和应开始明确了几天后，您的待遇。增加体液，直到您的尿液清除。

打电话给你的医生如果你建立一个100度以上发烧或有厚，血液凝块尿。

如果你的医生没有给你一张处方止痛药，采取两个泰勒诺每四个小时，因为需要。如果疼痛没有得到更好的，叫你的医生。

如果您收到的抗生素处方，采取的所有药品的指示。不要停止服用此药物，直到所有的药都消失了。

返回到通常的药物，除非另有指示您的医生。

不要服用阿司匹林的产品，直到您的尿液开始明确。

避免搬运重物（超过25至30磅）的很长一段时间内的第一个星期后，碎石。

您可能已经有些青肿，发红或轻微肿胀的治疗上。适用冰袋受影响的地区的任何肿胀您可能今天。24小时后，使用温暖的热量，加上您的止痛药，用于救济。

放置一个枕头较低地区落后的回坐在或驾驶任何可能有助于减轻疼痛或痛苦你。

应变您尿液的指示两，三个星期后碎石。采取任何碎片收集您和您的医生被派往进行分析

追问：请打电话给你的医生的办公室，安排预约。

在紧急情况下，请与您的医生

_____ M.D. _____

(病人或负责人)