

DISCHARGE ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ESWL

Это займет несколько часов, за лекарства для стирать, поэтому, когда вы дома, пока вы не чувствовали себя комфортно повышение активности.

Из-за лекарств, полученной во время лечения, не пью **ЛЮБОЙ АЛКОГОЛЬ**, диск, или использовать любой опасной **MACHINERY** в течение 24 часов.

Как ваш аппетит возвращается, начните с жидкостями, а затем касается вашего аппетита. Вернуться к обычной диете, если иное не врачом.

Моча будет кровавый и должен начинаться с четкого **несколько** дней после вашего обращения. Увеличение жидкости до тех пор, пока моча очищает.

Вызов врача вам, если вы развивать лихорадки выше 100 градусов или толстой, крови, моче-сущее.

Если Ваш врач не дал вам рецепт более *relievers* принять два Tylenol каждые четыре часа, по мере необходимости. Если боль не лучше, позвонить вам врачом.

Если вы получили предписание для антибиотики, принимать все лекарства в соответствии с назначением. Не прекращать этого лекарства до тех пор, пока все таблетки исчезли.

Вернуться к обычной лекарства, если иное не врачом.

Не принимайте аспирин продукцию до тех пор, пока моча начинает ясно.

Избегайте подъема тяжелых (свыше 25 до 30 фунтов) в течение длительных периодов времени, в течение первой недели после литотрипсии.

Вы можете иметь некоторые синяки, покраснения и небольшие отеки на ваши обращения на сайте. Применить пак в пострадавший район для любых опухоль может иметь сегодня. После 24 часов, используйте теплую тепла вместе с вашей боли лекарств, для оказания чрезвычайной помощи.

Размещение подушку позади нижней части спины, сидя или водительское может помочь облегчить боль или какой-либо боли у вас есть.

Процедить моче также направлена в течение двух-трех недель после литотрипсии. Принимать любые фрагменты вы собираете на ваш врач будет отправлен на анализ.

Последующие действия: Позвоните своему врачу, чтобы договориться о встрече.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, обратитесь к врачу _____

MD

(Пациента или ответственного лица)